

DESCRIPTION D'UN BATRACIEN NOUVEAU POUR LA FAUNE  
MALGACHE PLATYPELIS MILLOTI N. SP. (MICROHYLIDAE).

Par Jean GUIBÉ.

Aspect général svelte et très déprimé.

Langue entière, dents vomériennes en deux courtes séries, dans certains cas assez longues, mais n'atteignant jamais le niveau des choanes.

Tête large, aplatie, sa longueur est comprise 3 fois ou un peu moins dans la longueur du corps (du museau à l'extrémité de l'urostyle) et 1 fois  $\frac{1}{3}$  dans celle du tibia. Museau acuminé, obliquement tronqué en arrière de profil; sa longueur comprise 2 fois  $\frac{1}{2}$  dans la largeur de la tête et 3 fois dans la longueur du tibia.

Narines plus rapprochées du museau que de l'œil, l'espace œil-narine est plus étroit que l'espace internasal, interorbitaire et que le diamètre de l'œil. Canthus rostralis arrondi; région loréale oblique, concave. Espace interorbitaire égal à 2 fois la largeur de la paupière supérieure. Tympan petit, parfois peu distinct, au plus égal à  $\frac{1}{2}$  du diamètre de l'œil dont il est éloigné.

Doigts : longueurs comparées : 1-2-4-3; le premier égal à environ la moitié du second; de larges dilatations triangulaires terminales.

Orteils : le troisième égal ou un peu plus court que le cinquième; palmés au  $\frac{1}{3}$ ; les dilatations terminales sont plus étroites que celles des doigts. Tubercules métatarsiens et sous-articulaires indistincts.

Articulation tibio-tarsienne atteignant l'œil; longueur du tibia comprise 2 fois  $\frac{1}{4}$  à 2  $\frac{1}{2}$  dans celle du corps, plus grande que celle du fémur et du pied. Talons se recouvrant.

Tégument : entièrement lisses; parfois quelques granulations à la base de l'abdomen chez les mâles; ceux-ci sans cas vocal.

Coloration (en alcool). — Sur le tronc la teinte de fond est grise, on distingue une fine ligne médio-dorsale blanche et de grandes taches noires symétriques soulignées de blanc. Membres antérieurs : bras gris rosâtre, avant-bras et mains avec des taches noires. Membres postérieurs : cuisses rose rembrunies au niveau des genoux, une tache noire triangulaire sous le cloaque; jambes et pieds avec des taches noires plus ou moins disposées en bandes transversales.

Face ventrale blanchâtre rembrunié sous le menton et la gorge.

Origine : Lokoubé (Nossi-Bé) (IX/47) dans les gaines foliaires de Mangoko (*Typhonodorum Lindleyanum* Schott. Aroïdés) 5 exemplaires. J. MILLOT.

Laboratoire de Zoologie (Reptiles et Poissons) du Muséum.